

# What you need to know after your COVID-19 Vaccine

## Normal side effects you may experience

- Injection site pain
- Injection site swelling
- Injection site redness
- Tiredness
- Headache
- Muscle pain
- Chills
- Joint pain
- Fever
- Nausea
- Feeling unwell
- Swollen lymph nodes

## Call your provider if:

- Normal side effects listed above last for more than 72 hours
- You have had exposure to someone with a diagnosed COVID-19 infection
- You are experiencing COVID-19 symptoms (listed below, not considered a normal side effect)

**SYMPTOMS** of COVID-19 Infection include fever, chills, cough, stuffy nose, headache, shortness of breath, chest tightness, sore throat, lack of smell or taste, severe fatigue/exhaustion, muscle pain, diarrhea, nausea or vomiting

*Please note-you cannot get COVID-19 infection from the vaccine, however you can contract COVID-19 infection through normal community exposure*

## Symptoms/side effects you should seek immediate medical care

- Difficulty breathing
- Swelling of your face and throat
- A fast heartbeat
- A bad rash all over your body
- Dizziness and weakness

***You should receive the second dose of the Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccine no earlier than 21 days and Moderna no earlier than 28 days after your first dose. The Janseen (Johnson & Johnson) vaccine is a one dose vaccine. Please schedule your second appointment in MyChart to reserve your spot. If you do not have MyChart or if you need assistance scheduling call 608-720-5055.***

GN-608245-21

# Lo que debe saber después de recibir su vacuna contra el COVID-19

## Efectos Secundarios normales que podría tener

- Dolor en el área de la inyección
- inflamación en el área de la inyección
- enrojecimiento en el área de la inyección
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolores musculares
- escalofríos
- dolor en las articulaciones
- fiebre
- nauseas
- malestar general
- inflamación de nódulos linfáticos

## Llame a su proveedor si:

- Los efectos secundarios normales enumerados arriba tardan más de 72 horas
- Usted ha estado expuesto a alguien con una infección de COVID-19 diagnosticada
- Usted está teniendo síntomas de COVID-19 (enumerados debajo, que no se consideran un efecto secundario normal)

Los SÍNTOMAS de infección de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dificultad para respirar, opresión en el pecho, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto, cansancio severo/agotamiento, dolores musculares, diarrea, nauseas o vómitos

*Por favor tenga en cuenta que usted no puede infectarse de COVID-19 a través de la vacuna, sin embargo, usted puede contagiarse de COVID-19 a través de la exposición normal en la comunidad*

## Síntomas/efectos secundarios por los cuales debe buscar atención médica inmediata

- Dificultad para respirar
- Inflamación de la cara o la garganta
- Ritmo cardiaco acelerado
- Irritación severa en todo su cuerpo
- Mareaos y debilidad

*Usted debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNtech no antes de 21 días y la de Moderna no antes de 28 a partir del día en que recibió la primera dosis. La vacuna de Janseen (Johnson & Johnson) es una vacuna de una sola dosis. Por favor programe su segunda cita en MyChart tan pronto como le sea posible para garantizar que tenga un espacio reservado. Si usted no tiene MyChart o si necesita ayuda para programar su cita, llame al 608-720-5055.*

GN-608245-21