

Lo que debe saber después de recibir su vacuna contra el COVID-19

Efectos Secundarios normales que podría tener

- Dolor en el área de la inyección
- inflamación en el área de la inyección
- enrojecimiento en el área de la inyección
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolores musculares
- escalofríos
- dolor en las articulaciones
- fiebre
- náuseas
- malestar general
- inflamación de nódulos linfáticos

Llame a su proveedor si:

- Los efectos secundarios normales enumerados arriba tardan más de 72 horas
- Usted ha estado expuesto a alguien con una infección de COVID-19 diagnosticada
- Usted está teniendo síntomas de COVID-19 (enumerados debajo, que no se consideran un efecto secundario normal)

Los **SÍNTOMAS** de infección de COVID-19 incluyen fiebre, escalofríos, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dificultad para respirar, opresión en el pecho, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto, cansancio severo/agotamiento, dolores musculares, diarrea, náuseas o vómitos

Por favor tenga en cuenta que usted no puede infectarse de COVID-19 a través de la vacuna, sin embargo, usted puede contagiarse de COVID-19 a través de la exposición normal en la comunidad


Síntomas/efectos secundarios por los cuales debe buscar atención médica inmediata

- Dificultad para respirar
- Inflamación de la cara o la garganta
- Ritmo cardíaco acelerado
- Irritación severa en todo su cuerpo
- Mareos y debilidad

Usted debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech no antes de 21 días y la de Moderna no antes de 28 a partir del día en que recibió la primera dosis. La vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) es una vacuna de una sola dosis. Por favor programe su segunda cita en MyChart tan pronto como le sea posible para garantizar que tenga un espacio reservado. Si usted no tiene MyChart o si necesita ayuda para programar su cita, llame al 608-720-5055.

GN-608245-21

Enfoque la cámara aquí para ver la página web ➔



UWHealth